

Bruselas, 21 de septiembre de 2022
(OR. en)

**Expediente interinstitucional:
2022/0290(NLE)**

**12652/22
ADD 1**

SAN 524

NOTA DE TRANSMISIÓN

De:	Por la secretaria general de la Comisión Europea, D. ^a Martine DEPREZ, directora
Fecha de recepción:	20 de septiembre de 2022
A:	Secretaría General del Consejo
N.º doc. Ción.:	COM(2022) 474 final
Asunto:	ANEXO de la Propuesta de Recomendación del Consejo relativa a la mejora de la prevención mediante la detección precoz: un nuevo enfoque de la UE para el cribado del cáncer en sustitución de la Recomendación 2003/878/CE

Adjunto se remite a las Delegaciones el documento – COM(2022) 474 final.

Adj.: COM(2022) 474 final



COMISIÓN
EUROPEA

Bruselas, 20.9.2022
COM(2022) 474 final

ANNEX

ANEXO

de la

Propuesta de Recomendación del Consejo

**relativa a la mejora de la prevención mediante la detección precoz:
un nuevo enfoque de la UE para el cribado del cáncer
en sustitución de la Recomendación 2003/878/CE**

{SWD(2022) 296 final}

ANEXO

Cribados del cáncer que cumplen los requisitos establecidos en la Recomendación y para los cuales se detallarán especificaciones técnicas en orientaciones europeas con garantía de calidad:

Cáncer de mama:

cribado del cáncer de mama para mujeres de entre 45 y 74 años mediante mamografía digital o tomosíntesis digital de mama¹, y para las mujeres con mamas especialmente densas puede valorarse la imagen por resonancia magnética (IRM), cuando proceda desde el punto de vista médico.

Cáncer de cuello del útero:

pruebas para la detección del virus del papiloma humano (VPH) para las mujeres de entre 30 y 65 años, con una periodicidad de cinco años o más, y puede valorarse la adaptación de la edad y la periodicidad al riesgo individual basado en el historial de vacunación contra el VPH.

Cáncer colorrectal:

la prueba inmunoquímica fecal cuantitativa, con umbrales definidos en función del sexo y la edad y el resultado de una prueba anterior, se considera la prueba de cribado preferida para derivar a una colonoscopia de seguimiento a las personas de entre 50 y 74 años. Puede adoptarse la endoscopia como herramienta principal para aplicar estrategias combinadas.

Cáncer de pulmón:

teniendo en cuenta los datos que respaldan los cribados mediante tomografía computarizada de baja dosis y la necesidad de un enfoque escalonado, los países deben empezar a comprobar la viabilidad de este programa mediante estudios de ejecución combinados con estrategias de intervención planeadas y organizadas para el abandono del consumo de tabaco, comenzando por fumadores y exfumadores de entre 50 y 75 años, que hayan dejado de fumar en los 15 años anteriores y tengan un historial de tabaquismo de treinta años-paquete (el equivalente a fumar veinte cigarrillos al día durante treinta años)².

Cáncer de próstata:

teniendo en cuenta los datos y la cantidad significativa de cribados oportunistas en curso, los países deben adoptar un enfoque escalonado, en particular mediante proyectos piloto y estudios adicionales para evaluar la viabilidad de la ejecución de programas organizados³ con el fin de garantizar una calidad y gestión adecuadas sobre la base de la prueba del antígeno específico de la próstata (AEP) para los hombres de hasta 70 años, en combinación con la realización de imágenes por resonancia magnética (IRM) adicionales como prueba de seguimiento.

¹ [Orientaciones europeas sobre diagnóstico y cribado del cáncer de mama | ECIBC \(europa.eu\).](https://ecibc.europa.eu/)

² [Cribado del cáncer – SAPEA.](https://sapea.info/)

³ [cancer-screening-workshop-report-01.pdf \(sapea.info\).](https://sapea.info/cancer-screening-workshop-report-01.pdf)

Cáncer gástrico:

debe valorarse el cribado en busca de *Helicobacter pylori* en los países o regiones de estos en los que exista una incidencia y mortalidad por cáncer gástrico elevadas, de acuerdo con los umbrales que han de definirse en las orientaciones europeas con garantía de calidad. El cribado también debe abordar estrategias para detectar y monitorizar a los pacientes con lesiones estomacales precancerosas no relacionadas con infecciones por *Helicobacter pylori*.

Teniendo en cuenta los datos para el cribado y la necesidad de adoptar un enfoque escalonado, los países deben empezar por comprobar la viabilidad de este programa, en particular mediante estudios de ejecución.