



Euroopa Liidu
Nõukogu

Brüssel, 21. september 2022
(OR. en)

Institutsioonidevaheline
dokument:
2022/0290(NLE)

12652/22
ADD 1

SAN 524

SAATEMÄRKUSED

Saatja:	Euroopa Komisjoni peasekretär, allkirjastanud Martine DEPREZ, direktor
Kättesaamise kuupäev:	20. september 2022
Saaja:	Nõukogu peasekretariaat
Komisjoni dok nr:	COM(2022) 474 final
Teema:	LISA järgmise dokumendi juurde: Ettepanek: NÕUKOGU SOOVITUS, milles käsitletakse ennetamise tõhustamist varajase avastamise kaudu: vähktõve sõeluuringuid käsitlev uus ELi lähenemisviis, millega asendatakse nõukogu soovitus 2003/878/EÜ

Käesolevaga edastatakse delegatsioonidele dokument COM(2022) 474 final.

Lisatud: COM(2022) 474 final



EUROOPA
KOMISJON

Brüssel, 20.9.2022
COM(2022) 474 final

ANNEX

LISA

järgmise dokumendi juurde:

Ettepanek: NÕUKOGU SOOVITUS,

**milles käsitletakse ennetamise tõhustamist varajase avastamise kaudu: vähktõve
sõeluuringuid käsitlev uus ELi lähenemisviis,
millega asendatakse nõukogu soovitus 2003/878/EÜ**

{SWD(2022) 296 final}

LISA

Vähktõve sõeluuringud, mis vastavad soovitusete nõuetele ja mille tehnilisi kirjeldusi täiendatakse tagatud kvaliteediga Euroopa juhistes.

Rinnavähk

Rinnavähi sõeluuringud naistele alates 45. eluaastast kuni 74. eluaastani digitaalse mammograafia või rinna digitaalse tomosünteesiga¹ ning eriti tiheda rinnakoega naiste puhul kaaluda magnetresonantstomograafia (MRT) kasutamist, kui see on meditsiiniliselt näidustatud.

Emakakaelavähk

Inimese papilloomiviiruse (HPV) analüüs 30–65-aastastele naistele vähemalt viie aasta tagant; vanuse ja analüüsisageduse kohandamist kaalutakse individuaalse riski alusel, võttes arvesse seda, kas isikud on varasemalt HPV vastu vaktsineeritud.

Kolorektaalvähk

peitvere immuunkeemilist uuringut (FIT), mis on kvantitatiivne ja mille piirnormid on määratletud soo ja vanuse ning varasema analüüsitulemuse alusel, peetakse 50–74-aastaste isikute puhul eelistatud sõeluuringuks, mille põhjal võidakse saata kolonoskoopilisele järeluuringule. Kombineeritud strateegiate rakendamise peamise vahendina võib kasutada endoskoopiat.

Kopsuvähk

Võttes arvesse tõendeid, mis toetavad madala kiirusdoosiga kompuutertomograafiaga tehtavaid sõeluuringuid, ja vajadust järkjärgulise lähenemisviisi järele, peaksid riigid hakkama hindama selle programmi teostatavust, kasutades rakendusuuringuid kombineerituna suitsetamisest loobumiseks kavandatud ja organiseeritud sekkumisstrateegiatega, alustades praegustest ja endistest suitsetajatest, kes on suitsetamisest loobunud viimase 15 aasta jooksul, kes on 50–75-aastased ja suitsetanud 30 pakiaastat (vastab 20 sigareti suitsetamisele päevas 30 aasta jooksul)².

Eesnäärmevähk

Võttes arvesse tõendeid ja praegu tehtavate oportunistlike sõeluuringute märkimisväärset hulka, peaksid riigid rakendama järkjärgulist lähenemisviisi, sealhulgas katseid ja täiendavaid uuringuid, et hinnata selliste organiseeritud programmide³ rakendamise teostatavust, mille eesmärk on tagada asjakohane juhtimine ja kvaliteet kuni 70-aastastele meestele ettenähtud prostataspetsiifilise antigeeni (PSA) analüüsi põhjal koos järelkontrollina toimiva täiendava magnetresonantstomograafia protseduuriga.

¹ [Euroopa suunised rinnavähi sõeluuringute ja diagnoosimise kohta | ECIBC \(europa.eu\).](https://ecibc.europa.eu/)

² [Vähktõve sõeluuring – SAPEA.](https://sapea.info/)

³ [cancer-screening-workshop-report-01.pdf \(sapea.info\).](https://cancer-screening-workshop-report-01.pdf)

Maovähk

Helicobacter pylori sõeluuringu tegemist tuleks kaaluda nendes riikides või nende riikide piirkondades, kus vastavalt künnistele, mis määratakse kindlaks tagatud kvaliteediga Euroopa suunistes, on suur maovähi esinemissagedus ja sellest tingitud suremus. Sõeluuring peaks hõlmama ka *Helicobacter pylori* infektsioonidega mitteseotud vähieelsete maokahjustustega patsientide tuvastamise ja jälgimise strateegiaid.

Võttes arvesse sõeluuringu kohta olemasolevaid tõendeid ja vajadust järkjärgulise lähenemisviisi järele, peaksid riigid hakkama hindama selle programmi teostatavust, kasutades ka rakendusuuringuid.