



Europos Sąjungos
Taryba

Briuselis, 2022 m. rugsėjo 21 d.
(OR. en)

12652/22
ADD 1

Tarpinstitucinė byla:
2022/0290(NLE)

SAN 524

PRIDEDAMAS PRANEŠIMAS

nuo:	Europos Komisijos generalinės sekretorės, kurios vardu pasirašo direktorė Martine DEPREZ
gavimo data:	2022 m. rugsėjo 20 d.
kam:	Tarybos generaliniam sekretariatui
Komisijos dok. Nr.:	COM(2022) 474 final
Dalykas:	Pasiūlymo dėl Tarybos rekomendacijos dėl prevencijos stiprinimo taikant ankstyvojo nustatymo priemones „Naujas ES požiūris į vėžio atrankinę patikrą“, kuria pakeičiama Tarybos rekomendacija 2003/878/EB, PRIEDAS

Delegacijoms pridedamas dokumentas COM(2022) 474 final.

Priedama: COM(2022) 474 final



EUROPOS
KOMISIJA

Briuselis, 2022 09 20
COM(2022) 474 final

ANNEX

PRIEDAS

prie

pasiūlymo dėl Tarybos rekomendacijos

**dėl prevencijos stiprinimo taikant ankstyvojo nustatymo priemones „Naujas ES požiūris
į vėžio atrankinę patikrą“, kuria pakeičiama Tarybos rekomendacija 2003/878/EB**

{SWD(2022) 296 final}

PRIEDAS

Skirtingų rūšių vėžio atrankinė patikra, kuri atitinka rekomendacijos reikalavimus ir kurios techninės specifikacijos bus išsamiau apibrėžtos Europos gairėse dėl kokybės užtikrinimo.

Krūties vėžys

Vykdoma 45–74 m. amžiaus moterų krūties vėžio atrankinė patikra, joms atliekama skaitmeninė mamografija arba skaitmeninė krūties tomosintezė¹, taip pat skirta moterims, kurių krūties audiniai itin sutankėję, kurių atveju įvertinama galimybė atlikti magnetinio rezonanso vaizdinimo tyrimą, kai tai yra medicininio požiūriu tikslinga.

Gimdos kaklelio vėžys

30–65 m. moterims 5 metų ar didesniu intervalu atliekami tyrimai dėl žmogaus papilomos viruso (ŽPV), taip pat įvertinama galimybė pakoreguoti amžių ir intervalus atsižvelgiant į individualią riziką, remiantis kiekvieno asmens skiepavimo nuo ŽPV istorija.

Kolorektalinis vėžys

Atliekamas kiekybinis išmatų imunocheminis tyrimas, nustatčius atitinkamas ribines vertes pagal lytį ir amžių, ir ankstesnio tyrimo rezultatas laikomas tinkamiausiu atrankinės patikros kriterijumi siekiant nustatyti 50–74 metų amžiaus asmenis, kuriems toliau reikėtų atlikti kolonoskopiją. Endoskopija gali būti naudojama kaip pagrindinė priemonė mišrioms strategijoms įgyvendinti.

Plaučių vėžys

Atsižvelgiant į tai, kad atrankinė patikra atliekama naudojant mažadozę kompiuterinę tomografiją, ir į būtinybę taikyti laipsnišką metodą, šalys turėtų pradėti tikrinti šios programos įgyvendinamumą, naudodamos įgyvendinimo tyrimus kartu su planuojamomis ir organizuotomis intervencijos strategijomis, kuriomis siekiama padėti mesti rūkyti, pradedant nuo dabartinių rūkančių ir anksčiau rūkiusių asmenų, kurie per pastaruosius 15 metų neberūko, yra 50–75 metų amžiaus ir jų rūkymo istorija yra 30 pakelių metų (t. y. rūkyti po 20 cigarečių per dieną 30 metų)².

Prostatos vėžys

Atsižvelgdamos į šiuo metu vykdomos neorganizuotos atrankinės patikros duomenis ir didelį tokios atrankinės patikros mastą, šalys turėtų laipsniškai įgyvendinti atitinkamą atrankinę patikrą, įskaitant bandomuosius projektus ir tolesnius mokslinius tyrimus, kad įvertintų galimybę įgyvendinti organizuotas programas³, kuriomis būtų siekiama užtikrinti tinkamą valdymą ir kokybę, vyrams iki 70 metų atliekant tyrimus dėl prostatos specifinio antigeno (PSA) ir kartu tolesniame etape atliekant papildomą magnetinio rezonanso vaizdinimo tyrimą.

¹ [European guidelines on breast cancer screening and diagnosis | ECIBC \(europa.eu\)](https://ecibc.europa.eu/)

² [Cancer screening – SAPEA](https://sapea.info/)

³ [cancer-screening-workshop-report-01.pdf \(sapea.info\)](https://sapea.info/cancer-screening-workshop-report-01.pdf)

Skrandžio vėžys

Reikėtų apsvarstyti galimybę atlikti atrankinę patikrą dėl *Helicobacter pylori* tose šalyse ar tuose atitinkamos šalies regionuose, kuriuose yra didelis sergamumas skrandžio vėžiu ir su šiuo vėžiu susijęs mirtingumas, atsižvelgiant į ribines vertes, kurios bus nustatytos Europos gairėse dėl kokybės užtikrinimo. Atliekant atrankinę patikrą taip pat turėtų būti taikomos pacientų, turinčių ikivėžinių skrandžio pakitimų, nesusijusių su *Helicobacter pylori* infekcija, nustatymo ir stebėjimo strategijos.

Atsižvelgdamos į atrankinės patikros duomenis ir būtinybę laipsniškai įgyvendinti atitinkamą atrankinę patikrą, šalys turėtų pradėti tikrinti šios programos įgyvendinamumą, be kita ko, atlikdamos įgyvendinimo tyrimus.