



Raad van de
Europese Unie

Brussel, 21 september 2022
(OR. en)

12652/22
ADD 1

Interinstitutioneel dossier:
2022/0290(NLE)

SAN 524

BEGELEIDENDE NOTA

van:	de secretaris-generaal van de Europese Commissie, ondertekend door mevrouw Martine DEPREZ, directeur
ingekomen:	20 september 2022
aan:	het secretariaat-generaal van de Raad
nr. Comdoc.:	COM(2022) 474 final
Betreft:	BIJLAGE bij het voorstel voor een aanbeveling van de Raad over betere preventie met vroegtijdige opsporing: een nieuwe EU-aanpak van kankerscreening ter vervanging van Aanbeveling 2003/878/EG van de Raad

Hierbij gaat voor de delegaties document COM(2022) 474 final.

Bijlage: COM(2022) 474 final

Brussel, 20.9.2022
COM(2022) 474 final

ANNEX

BIJLAGE

bij

Voorstel voor een aanbeveling van de Raad

**over betere preventie met vroegtijdige opsporing:
een nieuwe EU-aanpak van kankerscreening
ter vervanging van Aanbeveling 2003/878/EG van de Raad**

{SWD(2022) 296 final}

BIJLAGE

Kankerscreenings die aan de vereisten van de aanbeveling voldoen en waarvoor de technische specificaties nader zullen worden gespecificeerd in Europese richtsnoeren met kwaliteitsborging:

borstkanker:

screenen op borstkanker bij vrouwen in de leeftijd van 45 tot 74 jaar met digitale mammografie of digitale borsttomosynthese¹, en voor vrouwen met zeer dicht borstweefsel beeldvorming middels magnetische resonantie (magnetic resonance imaging, MRI), indien medisch passend, in overweging nemen;

baarmoederhalskanker:

testen op het humaan papilloma-virus (HPV) bij vrouwen van 30 tot 65 jaar met een interval van 5 jaar of meer, en overwegen de leeftijd en frequentie op basis van de individuele HPV-vaccinatiegeschiedenis aan het individuele risico aan te passen;

colorectale kanker:

kwantitatieve fecale immunochemische tests (FIT), met drempels die op basis van geslacht, leeftijd en eerder testresultaat worden bepaald, worden beschouwd als de voorkeurscreeningstest voor het doorverwijzen van personen tussen 50 en 74 jaar naar follow-up-colonoscopie. Het kan zijn dat endoscopie wordt gekozen als een primair instrument om gecombineerde strategieën uit te voeren;

longkanker:

gezien het bewijs voor screening met behulp van lage-dosis-computertomografie en de noodzaak van een stapsgewijze aanpak, zouden landen moeten beginnen met het testen van de haalbaarheid van dit programma door gebruik te maken van onderzoek naar praktische toepassingen in combinatie met geplande en georganiseerde interventiestrategieën voor stoppen met roken, en moeten beginnen met mensen die momenteel nog roken en ex-rokers die in de voorgaande 15 jaar met roken zijn gestopt, tussen 50 en 75 jaar zijn en een rookgeschiedenis van 30 pakjaar hebben (equivalent aan het roken van 20 sigaretten per dag gedurende 30 jaar)²;

prostaatkanker:

gezien het bewijs en de aanzienlijke hoeveelheid lopende opportunistische screening, zouden landen een stapsgewijze aanpak moeten volgen, met inbegrip van proefprojecten en verder onderzoek om de haalbaarheid te beoordelen van de uitvoering van georganiseerde programma's³ die gericht zijn op het waarborgen van passend beheer en kwaliteit op basis van het testen op prostaatspecifieke antigeen (PSA) voor mannen tot 70 jaar, in combinatie met aanvullende beeldvorming middels magnetische resonantie als vervolgttest;

¹ [European guidelines on breast cancer screening and diagnosis | ECIBC \(europa.eu\)](#)

² [Cancer screening – SAPEA](#)

³ [cancer-screening-workshop-report-01.pdf \(sapea.info\)](#)

maagkanker:

in landen of regio's van landen waar de incidentie van en de sterfte aan maagkanker hoog zijn, zou overwogen moeten worden om op *Helicobacter pylori* te screenen, aan de hand van de in Europese richtsnoeren met kwaliteitsborging vast te stellen drempels; bij de screening zou ook aandacht moeten worden besteed aan strategieën voor de identificatie en het opvolgen van patiënten met precancereuze maaglaesies die geen verband houden met een infectie met *Helicobacter pylori*;

gezien het bewijs voor screening en de noodzaak om die stapsgewijs aan te pakken, zouden de landen moeten beginnen met het testen van de haalbaarheid van dit programma, onder meer door gebruik te maken van onderzoek naar praktische toepassingen.