

Bruxelas, 21 de setembro de 2022
(OR. en)

**Dossiê interinstitucional:
2022/0290(NLE)**

**12652/22
ADD 1**

SAN 524

NOTA DE ENVIO

de:	Secretária-geral da Comissão Europeia, com a assinatura de Martine DEPREZ, diretora
data de receção:	20 de setembro de 2022
para:	Secretariado-Geral do Conselho
n.º doc. Com.:	COM(2022) 474 final - ANEXO
Assunto:	ANEXO da Proposta de Recomendação do Conselho sobre o reforço da prevenção através da deteção precoce: uma nova abordagem da UE para o rastreio do cancro que substitui a Recomendação 2003/878/CE do Conselho

Envia-se em anexo, à atenção das delegações, o documento COM(2022) 474 final - ANEXO.

Anexo: COM(2022) 474 final - ANEXO



COMISSÃO
EUROPEIA

Bruxelas, 20.9.2022
COM(2022) 474 final

ANNEX

ANEXO

da

Proposta de Recomendação do Conselho

**sobre o reforço da prevenção através da deteção precoce: uma nova abordagem da UE
para o rastreio do cancro
que substitui a Recomendação 2003/878/CE do Conselho**

{SWD(2022) 296 final}

ANEXO

Testes de rastreio do cancro que cumprem os requisitos da recomendação e cujas especificações técnicas serão definidas mais pormenorizadamente nas orientações europeias com garantias de qualidade:

Cancro da mama:

Rastreio do cancro da mama nas mulheres dos 45 aos 74 anos por mamografia digital ou tomossíntese mamária digital¹; para as mulheres com tecido mamário particularmente denso considerar a imagiologia por ressonância magnética (IRM), quando adequado do ponto de vista médico.

Cancro do colo do útero:

Teste do vírus do papiloma humano (VPH) nas mulheres de 30 a 65 anos, com um intervalo de cinco anos ou mais, e considerar a adaptação das idades e dos intervalos ao risco individual com base no historial de vacinação contra o VPH de cada pessoa.

Cancro colorretal:

O teste imunoquímico fecal (TIF) quantitativo com limiares definidos em função do sexo e idade e dos resultados de um teste anterior é considerado o teste de rastreio preferencial para referenciar as pessoas para colonoscopia de seguimento entre os 50 e os 74 anos. A endoscopia pode ser adotada como instrumento principal para a aplicação de estratégias combinadas.

Cancro do pulmão:

Tendo em conta os dados existentes a favor do rastreio por tomografia computadorizada de baixa dose e a necessidade de adotar uma abordagem faseada, os países devem começar a testar a viabilidade deste programa utilizando estudos de execução associados a estratégias de intervenção de cessação do tabagismo planificadas e organizadas, começando pelos atuais fumadores e os ex-fumadores que deixaram de fumar nos 15 anos anteriores, com idades compreendidas entre os 50 e os 75 anos e com um historial de consumo de tabaco de 30 maços-ano (o que equivale a fumar 20 cigarros por dia durante 30 anos)².

Cancro da próstata:

Tendo em conta os dados disponíveis e a quantidade significativa de rastreios oportunistas em curso, os países devem adotar uma abordagem faseada que inclua a realização de projetos-piloto e de investigação suplementar para avaliar a viabilidade da execução de programas organizados³ visando garantir uma gestão e qualidade adequadas com base em testes do antígeno específico da próstata (PSA) nos homens até aos 70 anos, em combinação com um exame adicional de imagiologia por ressonância magnética (IRM) como teste de seguimento.

¹ [European guidelines on breast cancer screening and diagnosis | ECIBC \(europa.eu\)](#)

² [Cancer screening – SAPEA](#)

³ [cancer-screening-workshop-report-01.pdf \(sapea.info\)](#)

Cancro gástrico:

Deve considerar-se o rastreio da *Helicobacter pylori* nos países ou nas regiões de cada país onde a incidência e as taxas de mortalidade do cancro gástrico são elevadas, de acordo com limiares a definir nas orientações europeias com garantias de qualidade. O rastreio deve também englobar estratégias de identificação e vigilância de doentes com lesões gástricas pré-cancerosas não relacionadas com infeções por *Helicobacter pylori*.

Tendo em conta os dados existentes a favor do rastreio e a necessidade de adotar uma abordagem faseada, os países devem começar a testar a viabilidade deste programa, nomeadamente através da utilização de estudos de execução.