

**An Bhruiséil, 23 Deireadh Fómhair 2025
(OR. en)**

**14386/25
ADD 1**

**DENLEG 55
FOOD 93
SAN 664**

NÓTA CLÚDAIGH

ó:	Ardrúnaí an Choimisiúin Eorpaigh, arna s(h)íniú ag Martine DEPREZ, Stiúrthóir
dáta a fuarthas:	22 Deireadh Fómhair 2025
chuig:	Thérèse BLANCHET, Ardrúnaí Chomhairle an Aontais Eorpaigh
Uimh. an doic. ón gCoim.:	D(2025) 109690 annex
Ábhar:	IARSCRÍBHINNÍ a ghabhann le RIALACHÁN (AE).../... ÓN gCOIMISIÚN lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1333/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle a mhéid a bhaineann le carraigínin (E 407), guma pónaire lócaiste (E 410), guma guair (E 412), guma arabach (guma acáise) (E 414), guma xantáin (E 415), peictiní (E 440) agus sucsainéit ochtainile sóidiam stáirse (E 1450) a úsáid agus Rialachán (AE) Uimh. 231/2012 ón gCoimisiún a mhéid a bhaineann le sonraíochtaí le haghaidh guma pónaire lócaiste (E 410), guma guair (E 412), guma arabach (guma acáise) (E 414), guma xantáin (E 415), peictiní (E 440) agus sucsainéit ochtainile sóidiam stáirse (E 1450)

Gheobhaidh na toscaireachtaí i gceangal leis seo doiciméad D(2025) 109690 annex.

Faoi iamh: D(2025) 109690 annex



AN COIMISIÚN
EORPACH

An Bhruiséil, **XXX**
PLAN/2024/2042 ANNEX REV.1
(POOL/E2/2024/2042/2042 R1-EN
ANNEX.docx) D109690/02
[...](2025) **XXX** draft

ANNEXES 1 to 2

IARSCRÍBHINNÍ

a ghabhann le

RIALACHÁN (AE).../... ÓN gCOIMISIÚN

lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1333/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle a mhéid a bhaineann le carraigínin (E 407), guma pónaire lócaiste (E 410), guma guair (E 412), guma arabach (guma acáise) (E 414), guma xantáin (E 415), peictíní (E 440) agus sucsainéit ochtainile sóidiam stáirse (E 1450) a úsáid agus Rialachán (AE) Uimh. 231/2012 ón gCoimisiún a mhéid a bhaineann le sonraíochtaí le haghaidh guma pónaire lócaiste (E 410), guma guair (E 412), guma arabach (guma acáise) (E 414), guma xantáin (E 415), peictíní (E 440) agus sucsainéit ochtainile sóidiam stáirse (E 1450)

IARSCRÍBHINN I

Leasaítear Cuid E d'Iarscríbhinn II a ghabhann le Rialachán (CE) Uimh. 1333/2008 mar a leanas:

- (1) i gcatagóir 01.10 ('Deochanna bainnebhunaithe agus táirgí comhchosúla a cheaptar do leanaí óga'):

(a) cuirtear an méid seo a leanas in ionad na hiontrála maidir le E 407 Carraigínin:

	'E 407	Carraigínin	300	(X)'	
--	--------	-------------	-----	------	--

;

(b) cuirtear an méid seo a leanas in ionad na hiontrála maidir le 'E 410 Guma pónaire lócaiste':

	'E 410	Guma pónaire lócaiste	10 000	(X)'	
--	--------	-----------------------	--------	------	--

;

(c) cuirtear an méid seo a leanas in ionad na hiontrála maidir le E 412 Guma guair:

	'E 412	Guma guair	10 000	(X)'	
--	--------	------------	--------	------	--

;

(d) cuirtear an méid seo a leanas in ionad na hiontrála maidir le E 414 Guma arabach (guma acáise):

	'E 414	Guma arabach (guma acáise)	10 000	(X)'	
--	--------	----------------------------	--------	------	--

;

(e) cuirtear an méid seo a leanas in ionad na hiontrála maidir le E 415 Guma xantáin:

	'E 415	Guma xantáin	10 000	(X)'	
--	--------	--------------	--------	------	--

;

(f) cuirtear an méid seo a leanas in ionad na hiontrála maidir le 'E 440 Peictíní':

			'E 440	Peictíní	5 000	(X)'	
--	--	--	--------	----------	-------	------	--

;

(g) scriostar fonóta (21);

(h) cuirtear an fonóta nua (X) isteach i ndiaidh fhonóta (44):

'(X): Má chuirtear níos mó ná ceann amháin de na substaintí E 407, E 410, E 412, E 414, E 415 agus E 440 le hearra bia, ní mór an t-uasleibhéal a shocraítear maidir leis an earra bia sin le haghaidh gach ceann de na substaintí sin a ísliú de réir na coda coibhneasta sin mar tá sí ann leis na substaintí eile san earra bia sin ';

- (2) I gcatagóir 13.1.1 ('Bainne foirmle do naíonáin mar a shainmhínítear le Rialachán (AE) Uimh. 609/2013') scriostar an iontráil maidir le E 412 Guma guair;

(3) i gcatagóir 13.1.5.1 (Bianna chun críocha speisialta míochaine mar a shainmhínítear i Rialachán (AE) Uimh. 609/2013, a cheaptar do naíonáin):

(a) cuirtear an méid seo a leanas in ionad na chéad abairte:

‘Tá feidhm ag breiseáin chatagóirí 13.1.1 agus 13.1.2, cé is moite de E 412’;

(b) cuirtear an méid seo a leanas in ionad na hiontrála maidir le ‘E 410 Guma pónaire lócaiste’:

‘E 410	Guma pónaire lócaiste	5 300	Ó thráth na breithe ar aghaidh i dtáirgí chun an aife gastraeasafagach a laghdú’
--------	-----------------------	-------	--

;

(c) scriostar an iontráil maidir le E 412 Guma guair;

(d) cuirtear an méid seo a leanas in ionad na hiontrála maidir le ‘E 440 Peictiní’:

‘E 440	Peictiní	4 000	Ó thráth na breithe ar aghaidh i dtáirgí le haghaidh neamhoird ghastraistéigeacha’
--------	----------	-------	--

;

(e) cuirtear an méid seo a leanas in ionad na hiontrála maidir le E 1450 Sucsainéit ochtainile sóidiam stáirse:

‘E 1450	Sucsainéit ochtainile sóidiam stáirse	20 000	i mbainne foirmle do naíonáin agus bainne foirmle leantach amháin Tréimhse cur i bhfeidhm: go dtí [24 mhí tar éis dháta theacht i bhfeidhm an Rialacháin seo]
E 1450	Sucsainéit ochtainile sóidiam stáirse	10 000	i mbainne foirmle do naíonáin agus bainne foirmle leantach amháin Tréimhse cur i bhfeidhm: ón [24 mhí tar éis dháta theacht i bhfeidhm an

				<i>Rialacháin seo]</i>
--	--	--	--	------------------------

;

- (4) i gcatagóir 13.1.5.2 (Bianna chun críocha speisialta míochaine mar a shainmhínítear i Rialachán (AE) Uimh. 609/2013, a cheaptar do naíonáin atá 4 mhí d'aois agus níos sine agus do leanaí óga):

- (a) cuirtear an méid seo a leanas in ionad na chéad abairte:

‘Tá feidhm ag breiseáin chatagóirí 13.1.2 agus 13.1.3, cé is moite de E 270, E 333, E 341, E 412.’;

- (b) cuirtear an méid seo a leanas in ionad na hiontrála maidir le ‘E 410 Guma pónaire lócaiste’:

	‘E 410	Guma pónaire lócaiste	5 300	Ó thráth na breithe ar aghaidh i dtáirgí chun an aife gastra-éasafagach a laghdú’
--	--------	-----------------------	-------	---

;

- (c) cuirtear an méid seo a leanas in ionad na hiontrála maidir le E 412 Guma guair;

	‘E 412	Guma guair	10 000	Ó thráth na breithe ar aghaidh i dtáirgí i bhfoirmle leachtacha ina bhfuil próitéiní hidrealaithe, peiptídí nó aimíonaigéid Tréimhse cur i bhfeidhm: go dtí an 27 Aibreán 2027’
--	--------	------------	--------	---

;

- (d) cuirtear an méid seo a leanas in ionad na hiontrála maidir le ‘E 440 Peictíní’:

	‘E 440	Peictíní	4 000	Ó thráth na breithe ar aghaidh i dtáirgí le haghaidh neamhoird ghastraistéigeacha’
--	--------	----------	-------	--

;

- (e) cuirtear an méid seo a leanas in ionad na hiontrála maidir le E 1450 Sucsainéit ochtainile sóidiam stáirse:

	‘E 1450	Sucsainéit ochtainile sóidiam stáirse	20 000	Tréimhse cur i bhfeidhm: go dtí [24 mhí tar éis dháta theacht i bhfeidhm an Rialacháin seo]
	E 1450	Sucsainéit ochtainile sóidiam stáirse	10 000	Tréimhse cur i bhfeidhm: ón [24 mhí tar éis dháta theacht i

				<i>bhfeidhm an Rialacháin seo]</i>
--	--	--	--	--

.

IARSCRÍBHINN II

Leasaítear mar a leanas an Iarscríbhinn a ghabhann le Rialachán (AE) 231/2012:

- (1) cuirtear an méid seo a leanas in ionad na hiontrála maidir le ‘E 410 GUMA PÓNAIRE LÓCAISTE’:

E 410 GUMA PÓNAIRE LÓCAISTE

Comhchiallaigh	Guma pónaire carúib; Guma <i>algaroba</i>
Sainmhíniú	Is éard atá i nguma pónaire lócaiste an inspeirm mheilte ó shíolta thréithchineálacha an chrainn carúib, <i>Cerastionia siliqua</i> (L.) Taub. (fine <i>Leguminosae</i>). Déantar na síolta a scillgeadh trí na heithní a chóireáil le haigéad sulfarach caolaithe nó le cóireálacha meicniúla teirmeacha, an ginidín a dhíothú, agus an inspeirm a mhuilleáil agus a scagadh ina dhiaidh sin chun guma pónaire lócaiste nádúrtha a fháil. Is éard atá i nguma pónaire lócaiste den chuid is mó polaisiúicrid hidreacollóideach ardmheáchain mhóilínigh, atá comhdhéanta d’aonaid ghalachtaipioranóis agus mhannaipioranóis atá comhcheangailte trí naisc ghliocóisídeacha, rud ar féidir tuairisc cheimiceach a thabhairt air mar galachtamannan.
Einecs	232-541-5
Uimhir CAS	9000-40-2
Ainm ceimiceach	
Foirmle cheimiceach	
Meáchan móilíneach	50 000 - 3 000 000
Measúnacht	Cion galachtamannain nach lú ná 75 %
Tuairisc	Púdar idir bán agus scothbhuí-bhán, nach mór gan bholadh
Sainaithint	
Tástáil le haghaidh galachtóis	Pas sa tástáil
Tástáil le haghaidh mannóis	Pas sa tástáil
Scrúdú micreascópach	Cuir roinnt sampla mheilte i dtuaslagán uiscí ina bhfuil cion iaidín 0,5 % agus cion potaisiam iaidíde 1 % ar shleamhnán gloine agus scrúdaigh faoi mhicreascóp é. I nguma pónaire lócaiste tá cealla fadsínte i bhfoirm feadán, iad scartha nó beagán idirspásaithe. Níl a n-inneachar donn chomh gnáthfhoirmithe ná mar atá i nguma guair. Léiríonn guma guair dlúthghrúpaí cealla atá idir cruinn agus ar chruth an phiorra. Tá a n-inneachar idir buí agus donn

Intuaslagthacht	Ineasraithe go hiomlán in uisce te, dothuaslagtha in eatánól
Íonacht	
Caillteanas mar gheall ar thriomú	Nach mó ná 15 % (105 °C, 5 uair an chloig)
Luaith	Nach mó ná 1,2 % arna cinneadh ag 800 °C
Próitéin (N × 6,25)	Nach mó ná 7 %
Ábhar dothuaslagtha in aigéad	Nach mó ná 4 %
Stáirse	Ní féidir é a bhrath leis an modh seo a leanas: cuir cúpla braon de thuaslagán iaidín le heasrán 1 in 10 den sampla. Ní ghintear aon dath gorm.
Arsanaic	Nach mó ná 0,1 mg/kg
Luaidhe	Nach mó ná 0,4 mg/kg
Mearcair	Nach mó ná 0,1 mg/kg
Caidmiam	Nach mó ná 0,1 mg/kg
Eatánól agus própán-2-ól	Nach mó ná 1 % ina n-aonar nó i gcuingir
Critéir mhicribhitheolaíocha	
Áireamh coilíneachtaí aeróbacha	Nach mó ná 5 000 ADC/g
Giosta agus múscaín	Nach mó ná 500 ADC/g
<i>Enterobacteriaceae</i>	Neamhláithreach in 10 g (i gcás ina gcuirtear é le bainne foirmle triomaithe do naíonáin, bianna triomaithe chun críocha speisialta míochaine a cheaptar do naíonáin atá faoi bhun 6 mhí d'aois agus foirmle leantach triomaithe, agus sa chás sin amháin)
<i>Escherichia coli</i>	Neamhláithreach in 1 g
<i>Salmonella</i> spp.	Neamhláithreach in 25 g
<i>Cronobacter</i> spp. (<i>Enterobacter sakazakii</i>)	Neamhláithreach in 10 g (i gcás ina gcuirtear é le bainne foirmle triomaithe do naíonáin agus bianna triomaithe chun críocha speisialta míochaine a cheaptar do naíonáin atá faoi bhun 6 mhí d'aois, agus sa chás sin amháin)‘

;

(2) cuirtear an méid seo a leanas in ionad na hiontrála maidir le ‘E 412 GUMA GUAIR’:
‘E 412 GUMA GUAIR

Comhchiallaigh	Guma <i>cyamopsis</i> ; Plúr guair
Sainmhíniú	Is eard atá i nguma guair an inspeirm mheilte ó shíolta thréithchineálacha an phlanda guair, <i>Cyamopsis tetragonolobus</i> (L.) Taub. (fine <i>Leguminosae</i>). Déantar an ginidín agus an inspeirm a dheighilt trí mhuilleáil agus criathrú. Baintear an crotal trí chóireáil le haer te atá tais nó tirim agus le criathrú. Is éard atá ann den chuid is mó polaisiúicríd hidreacollóideach ardmheáchain mhóilínigh, atá comhdhéanta d’aonaid ghalachtaipioranóis agus mhannaipioranóis atá comhcheangailte trí naisc ghliocóisídeacha, rud ar féidir tuairisc cheimiceach a thabhairt air mar galachtamannan. Féadfar an guma a hidrealú go páirteach trí chóireáil teasa, trí chóireáil le haigéid éadrom nó trí chóireáil ocsaídiúcháin alcaileach le haghaidh coigeartú slaodachta.
Einecs	232-536-0
Uimhir CAS	9000-30-0
Ainm ceimiceach	
Foirmle cheimiceach	
Meáchan móilíneach	50 000 – 8 000 000
Measúnacht	Cion galachtamannain nach lú ná 75 %
Tuairisc	Púdar idir bán agus scothbhuí-bhán, nach mór gan bholadh
Sainaithint	
Tástáil le haghaidh galachtóis	Pas sa tástáil
Tástáil le haghaidh mannóis	Pas sa tástáil
Intuaslagthacht	Ineasraithe in uisce fuar
Íonacht	
Caillteanas mar gheall ar thriomú	Nach mó ná 15 % (105 °C, 5 uair an chloig)
Luaith	Nach mó ná 5,5 % arna cinneadh ag 800 °C

Ábhar dothuaslagtha in aigéad	Nach mó ná 7 %
Próitéin	Nach mó ná 10 % (fachtoir N x 6,25) (modh Kjeldahl)
Stáirse	Ní féidir é a bhrath leis an modh seo a leanas: cuir cúpla braon de thuaslagán iaidín le heasrán 1 in 10 den sampla. Ní ghintear aon dath gorm.
Sárocsaídí orgánacha	Nach mó ná 0,7 meq ocsaigin ghníomhach/kg sampla
Fúrfúral	Nach mó ná 1 mg/kg
Peinteaclóraifeanól	Nach mó ná 0,01 mg/kg
Arsanaic	Nach mó ná 0,1 mg/kg
Luaidhe	Nach mó ná 0,2 mg/kg
Mearcair	Nach mó ná 0,1 mg/kg
Caidmiam	Nach mó ná 0,1 mg/kg
Critéir mhicribhitheolaíocha	
Áireamh coilíneachtaí aeróbacha	Nach mó ná 5 000 ADC/g
Giosta agus múscaín	Nach mó ná 500 ADC/g
<i>Enterobacteriaceae</i>	Neamhláithreach in 10 g (i gcás ina gcuirtear é le bainne foirmle triomaithe do naíonáin, bianna triomaithe chun críocha speisialta míochaine a cheaptar do naíonáin atá faoi bhun 6 mhí d'aois agus foirmle leantach triomaithe, agus sa chás sin amháin)
<i>Escherichia coli</i>	Neamhláithreach in 1 g
<i>Salmonella</i> spp.	Neamhláithreach in 25 g'

;

(3) cuirtear an méid seo a leanas in ionad na hiontrála maidir le E 414 GUMA ACÁISE: 'E 414 GUMA ARABACH (GUMA ACÁISE)

Comhchiallaigh	
Sainmhíniú	Úscadh triomaithe atá i nguma acáise a fhaightear ó ghais agus ó bhraintsí tréithchineálacha <i>Acacia senegal</i> (L) Willdenow nó speicis acáise (fine <i>Leguminosae</i>) a bhfuil dlúthbhaint acu le chéile. Is éard atá ann den chuid is mó polaisiúicrídí hidreacollóideacha ardmheáchain mhóilínigh agus a salainn chailciam, mhaignéisiam

	agus photaisiam, a thugann araibionós, galachtós, ramnós agus aigéad glúcúronach nuair a dhéantar hidrealú orthu.
Einecs	232-519-5
Uimhir CAS	9000-01-5
Ainm ceimiceach	
Foirmle cheimiceach	
Meáchan móilíneach	Thart ar 350 000
Measúnacht	
Tuairisc	Tagann guma acáise neamh-mheilte chun cinn i bhfoirm braonta sféaróideach bána nó scothbhuí-bhána de mhéideanna éagsúla nó mar bhloghanna uilleacha agus uaireanta measctar é le bloghanna níos dorcha. Tagann sé chun cinn freisin i bhfoirm calóg, gráinníní nó phúdair idir bán agus scothbhuí nó i bhfoirm ábhair spraethriomaithe.
Sainaithint	
Intuaslagthacht	Tuaslagtar 1 g in 2 ml d'uisce fuar, rud a chruthaíonn easrán a shreabhann go héasca agus atá aigéadach go litmeasach, dothuaslagtha in eatánól.
Íonacht	
Caillteanas mar gheall ar thriomú	Nach mó ná 17 % (105 °C, 5 uair an chloig) i gcás ábhar gráinneach agus nach mó ná 10 % (105 °C, 4 uair an chloig) i gcás ábhar spraethriomaithe
Iomlán na luatha	Nach mó ná 4 %
Luaith dothuaslagtha in aigéad	Nach mó ná 0,5 %
Ábhar dothuaslagtha in aigéad	Nach mó ná 1 %
Stáirse nó deistrin	Déan easrán 1 in 50 den ghuma a fhiuchadh agus ansin déan é a fhuarú. Cuir aon bhraon amháin de thuaslagán iaidín le 5 ml de. Ní thugtar aon dath scothghorm ná scothdhearg.
Tainnin	Cuir thart ar 0,1 ml de thuaslagán clóiríde feirí (9 g FeCl ₃ .6H ₂ O déanta suas go 100 ml le huisce) le 10 ml d'easrán 1 in 50. Ní chruthaítear aon dathú scothdhubh ná deascán scothdhubh.
Arsanaic	Nach mó ná 0,1 mg/kg

Luaidhe	Nach mó ná 0,05 mg/kg
Mearcair	Nach mó ná 0,05 mg/kg
Caidmiam	Nach mó ná 0,05 mg/kg
Alúmanam	Nach mó ná 100 mg/kg (i gcás ina gcuirtear é le bianna do naíonáin agus do leanaí óga, agus sa chás sin amháin) Nach mó ná 200 mg/kg (le haghaidh na n-úsáidí uile cé is moite de bhianna a cheaptar do naíonáin agus do leanaí óga amháin)
Táirgí hidrealaithe	Neamhláithreacht mannanóis, xiolóis agus aigéid ghalachtúrónaigh (arna chinneadh le crómatagraíocht).
Próitéiní	Nach mó ná 3,5 % Na hocsaíodáisí agus sárocsaíodáisí a bhíonn i nguma acáise go nádúrtha nó mar thoradh ar phróiseáil, ba cheart iad a dhíghníomhachtú le linn próiseas monaraíochta guma acáise lena úsáid i mbianna do naíonáin agus do leanaí óga.
Critéir mhicribhitheolaíocha	
Áireamh coilíneachtaí aeróbacha	Nach mó ná 10 000 ADC/g
Giosta agus múscaín	Nach mó ná 10 000 ADC/g
<i>Salmonella</i> spp.	Neamhláithreach in 25 g
<i>Enterobacteriaceae</i>	Neamhláithreach in 10 g (i gcás ina gcuirtear é le bainne foirmle triomaithe do naíonáin, bianna triomaithe chun críocha speisialta míochaine a cheaptar do naíonáin atá faoi bhun 6 mhí d'aois agus foirmle leantach triomaithe, agus sa chás sin amháin)
<i>Escherichia coli</i>	Neamhláithreach in 5 g
<i>Cronobacter</i> spp. (<i>Enterobacter sakazakii</i>)	Neamhláithreach in 10 g (i gcás ina gcuirtear é le bainne foirmle triomaithe do naíonáin agus bianna triomaithe chun críocha speisialta míochaine a cheaptar do naíonáin atá faoi bhun 6 mhí d'aois, agus sa chás sin amháin)

;

- (4) cuirtear an méid seo a leanas in ionad na hiontrála maidir le ‘E 415 GUMA XANTÁIN’:

‘E 415 GUMA XANTÁIN

Comhchiallaigh	
-----------------------	--

Sainmhíniú	Is éard atá i nguma xantáin guma polaisiúicríde ardmheáchain mhóilínigh arna tháirgeadh trí choipeadh saothráin íon carbaihiodráite le tréithchineálacha <i>Xanthomonas campestris</i> , a shainaithnítear go soiléir agus a chomhlíonann na critéir maidir le cáiliú le haghaidh stádas QPS (i.e. neamhláithreachta géinte frithsheasmhachta in aghaidh ábhair fhrithmhiocróbacha faighte), a íonaítear trí ghnóthú le heatánól nó le própán-2-ól, triomaithe agus muilleáilte. Tá D-glúcós agus D-mannós i nguma xantáin agus is iad sin na haonaid heacsóis is mó atá ann, mar aon le haigéad D-glúcúróinach, aigéad piorúvach agus aigéad aicéiteach, agus ullmhaítear é mar shalann sóidiam, potaisiam nó cailciam. Tá a easrú in uisce neodrach. Ní mór gan aon ghníomhaíocht einsíme iarmharach a bheith le brath sa táirge deiridh.
Einecs	234-394-2
Uimhir CAS	11138-66-2
Ainm ceimiceach	
Foirmle cheimiceach	
Meáchan móilíneach	Thart ar 1 000 000
Measúnacht	Tugann sé, ar bhonn triomaithe, cion nach lú ná 4,2 % agus nach mó ná 5 % de CO ₂ a chomhfhreagraíonn do chion guma xantáin idir 91 % agus 108 %
Tuairisc	Púdar ar dhath an uachtair
Sainaithint	
Intuaslagthacht	Ineasraithe in uisce. Dothuaslagtha in eatánól.
Íonacht	
Caillteanas mar gheall ar thriomú	Nach mó ná 15 % (105 °C, 2,5 uair an chloig)
Iomlán na luatha	Nach mó ná 16 % ar bhonn ainhidriúil arna chinneadh ag 650 °C tar éis triomú ag 105 °C ar feadh 4 uair an chloig
Aigéad piorúvach	Nach lú ná 1,5 %
Nítrigin	Nach mó ná 1,5 % (modh Kjeldahl)
Eatánól agus própán-2-ól	Nach mó ná 500 mg/kg ina n-aonar nó i gcuingir
Arsanaic	Nach mó ná 0,1 mg/kg

Luaidhe	Nach mó ná 0,5 mg/kg
Mearcair	Nach mó ná 0,05 mg/kg
Caidmiam	Nach mó ná 0,3 mg/kg
Critéir mhicribhitheolaíocha	
Áireamh coilíneachtaí aeróbacha	Nach mó ná 5 000 ADC/g
Giosta agus múscaín	Nach mó ná 300 ADC/g
<i>Enterobacteriaceae</i>	Neamhláithreach in 10 g (i gcás ina gcuirtear é le bainne foirmle triomaithe do naíonáin, bianna triomaithe chun críocha speisialta míochaine a cheaptar do naíonáin atá faoi bhun 6 mhí d'aois agus foirmle leantach triomaithe, agus sa chás sin amháin)
<i>Escherichia coli</i>	Neamhláithreach in 5 g
<i>Salmonella</i> spp.	Neamhláithreach in 25 g
<i>Cronobacter</i> spp. (<i>Enterobacter sakazakii</i>)	Neamhláithreach in 10 g (i gcás ina gcuirtear é le bainne foirmle triomaithe do naíonáin agus bianna triomaithe chun críocha speisialta míochaine a cheaptar do naíonáin atá faoi bhun 6 mhí d'aois, agus sa chás sin amháin)
<i>Xanthomonas campestris</i>	Neamhláithreach ceall imharthana in 1 g

;

(5) cuirtear an méid seo a leanas in ionad na hiontrála maidir le 'E 440 (i) PEICTIN':

'E 440 (i) PEICTIN

Comhchiallaigh	
Sainmhíniú	Is éard atá i bpeictin den chuid is mó na heistir mheitile pháirteacha d'aigéad polagalachtúrónach agus a salainn amóiniam, sóidiam, photaisiam agus chailciam. Faightear í trí thréithchineálacha ábhair plandaí inite iomchuí, torthaí citris nó úlla de ghnáth, a eastóscadh i meán uiscí. Ní mór gan aon ghníomhaíocht einsíme iarmharach a bheith le brath sa táirge deiridh. Ní úsáidfear aon deascóir orgánach seachas meatánól, eatánól agus propán-2-ól.
Einecs	232-553-0
Ainm ceimiceach	
Foirmle cheimiceach	

Meáchan móilíneach	
Measúnacht	Cion aigéid ghalachtúrónaigh nach lú ná 65 % ar bhonn saor ó luaith agus ar bhonn ainhidriúil tar éis é a ní le haigéad agus le halcól
Tuairisc	Púdar bán, buí éadrom, liath éadrom nó donn éadrom
Sainaithint	
Intuaslagthacht	Ineasraithe in uisce, lena gcruthaítear easrú collóideach ópalach. Dothuaslagtha in eatánól.
Íonacht	
Caillteanas mar gheall ar thriomú	Nach mó ná 12 % (105 °C, 2 uair an chloig)
Luaith dothuaslagtha in aigéad	Nach mó ná 1 % (dothuaslagtha a bheag nó a mhór in aigéad hidreaclórach 3N)
Dé-ocsaíd sulfair	Nach mó ná 50 mg/kg ar bhonn ainhidriúil
Cion nítrigine	Nach mó ná 1,0 % tar éis é a ní le haigéad agus le heatánól
Iomlán na n-ábhar dothuaslagtha	Nach mó ná 3 %
Iarmhair tuaslagóirí	Cion nach mó ná 1 % de shaormheatánól, saoreatánól agus saorphrópán-2-ól, ina n-aonar nó i gcuingir, ar bhonn saor ó ábhar agus so-ghalaithe
Arsanaic	Nach mó ná 0,1 mg/kg
Luaidhe	Nach mó ná 0,3 mg/kg (i gcás ina gcuirtear é le bianna do naíonáin agus do leanaí óga, agus sa chás sin amháin) Nach mó ná 1 mg/kg (le haghaidh na n-úsáidí uile cé is moite de bhianna a cheaptar do naíonáin agus do leanaí óga amháin)
Mearcair	Nach mó ná 0,1 mg/kg
Caidmiam	Nach mó ná 0,1 mg/kg (i gcás ina gcuirtear é le bianna do naíonáin agus do leanaí óga, agus sa chás sin amháin) Nach mó ná 0,5 mg/kg (le haghaidh na n-úsáidí uile cé is moite de bhianna a cheaptar do naíonáin agus do leanaí óga amháin)
Alúmanam	Nach mó ná 120 mg/kg (i gcás ina gcuirtear é le bia do naíonáin agus do leanaí óga, agus sa chás sin amháin) Nach mó ná 200 mg/kg (le haghaidh na n-úsáidí uile cé is moite de bhianna a cheaptar do naíonáin agus do leanaí óga amháin)

Critéir mhicribhitheolaíocha	
<i>Enterobacteriaceae</i>	Neamhláithreach in 10 g (i gcás ina gcuirtear é le bainne foirmle triomaithe do naíonáin, bianna triomaithe chun críocha speisialta míochaine a cheaptar do naíonáin atá faoi bhun 6 mhí d'aois agus foirmle leantach triomaithe, agus sa chás sin amháin)
<i>Escherichia coli</i>	Neamhláithreach in 10 g
<i>Salmonella</i> spp.	Neamhláithreach in 25 g (i gcás ina gcuirtear é le bainne foirmle triomaithe do naíonáin, bianna triomaithe chun críocha speisialta míochaine a cheaptar do naíonáin atá faoi bhun 6 mhí d'aois agus foirmle leantach triomaithe, agus sa chás sin amháin)
<i>Cronobacter</i> spp. (<i>Enterobacter sakazakii</i>)	Neamhláithreach in 10 g (i gcás ina gcuirtear é le bainne foirmle triomaithe do naíonáin agus bianna triomaithe chun críocha speisialta míochaine a cheaptar do naíonáin atá faoi bhun 6 mhí d'aois, agus sa chás sin amháin)

;

- (6) cuirtear an méid seo a leanas in ionad na hiontrála maidir le 'E 440 (ii) PEICTIN AIMÍDITHE':

'E 440 (ii) PEICTIN AIMÍDITHE

Comhchiallaigh	
Sainmhíniú	Is éard atá i bpeictin aimídithe den chuid is mó na heistir mheitile pháirteacha agus na haimídí d'aigéad polagalachtúrónach agus a salainn amóiniam, sóidiam, photaisiam agus chailciam. Faightear í trí thréithchineálacha iomchuí d'ábhar plandaí inite, torthaí citris nó úlla de ghnáth, a eastóscadh i meán uiscí, agus trí chóireáil le hamóinia faoi dhálaí alcaileacha. Ní mór gan aon ghníomhaíocht einsime iarmharach a bheith le brath sa táirge deiridh. Ní úsáidfear aon deascóir orgánach seachas meatánól, eatánól agus propán-2-ól.
Einecs	
Ainm ceimiceach	
Foirmle cheimiceach	
Meáchan móilíneach	
Measúnacht	Cion aigéid ghalachtúrónaigh nach lú ná 65 % ar bhonn saor ó luaith agus ar bhonn ainhidriúil tar éis é a ní le haigéad agus le halcól
Tuairisc	Púdar bán, buí éadrom, scothliath éadrom nó scothdhonn éadrom

Sainaithint	
Intuaslagthacht	Ineasraithe in uisce, lena gcruthaítear easrú collóideach ópalach. Dothuaslagtha in eatánól.
Íonacht	
Caillteanas mar gheall ar thríomú	Nach mó ná 12 % (105 °C, 2 uair an chloig)
Luaith dothuaslagtha in aigéad	Nach mó ná 1 % (dothuaslagtha a bheag nó a mhór in aigéad hidreaclórach 3N)
Méid an aimídithe	Nach mó ná 25 % d'iomlán na gcarbocsailghrúpaí
Dé-ocsaíd sulfair	Nach mó ná 50 mg/kg ar bhonn ainhidriúil
Cion nítrigine	Nach mó ná 2,5 % tar éis é a ní le haigéad agus le heatánól
Iomlán na n-ábhar dothuaslagtha:	Nach mó ná 3 %
Iarmhair tuaslagóirí	Cion nach mó ná 1 % de mheatánól, eatánól agus própán-2-ól, ina n-aonar nó i gcuingir, ar bhonn saor ó ábhar agus so-ghalaithe
Arsanaic	Nach mó ná 0,1 mg/kg
Luaidhe	Nach mó ná 0,3 mg/kg (i gcás ina gcuirtear é le bianna do naíonáin agus do leanaí óga, agus sa chás sin amháin) Nach mó ná 1 mg/kg (le haghaidh na n-úsáidí uile cé is moite de bhianna a cheaptar do naíonáin agus do leanaí óga amháin)
Mearcair	Nach mó ná 0,1 mg/kg
Caidmiam	Nach mó ná 0,1 mg/kg (i gcás ina gcuirtear é le bianna do naíonáin agus do leanaí óga, agus sa chás sin amháin) Nach mó ná 0,5 mg/kg (le haghaidh na n-úsáidí uile cé is moite de bhianna a cheaptar do naíonáin agus do leanaí óga amháin)
Alúmanam	Nach mó ná 120 mg/kg (i gcás ina gcuirtear é le bia do naíonáin agus do leanaí óga, agus sa chás sin amháin) Nach mó ná 200 mg/kg (le haghaidh na n-úsáidí uile cé is moite de bhianna a cheaptar do naíonáin agus do leanaí óga amháin)
Critéir mhicribhitheolaíocha	
<i>Enterobacteriaceae</i>	Neamhláithreach in 10 g (i gcás ina gcuirtear é le bainne foirmle triomaithe do naíonáin, bianna triomaithe chun críocha speisialta

	míochaine a cheaptar do naíonáin atá faoi bhun 6 mhí d'aois agus foirmle leantach triomaithe, agus sa chás sin amháin)
<i>Escherichia coli</i>	Neamhláithreach in 10 g
<i>Salmonella</i> spp.	Neamhláithreach in 25 g (i gcás ina gcuirtear é le bainne foirmle triomaithe do naíonáin, bianna triomaithe chun críocha speisialta míochaine a cheaptar do naíonáin atá faoi bhun 6 mhí d'aois agus foirmle leantach triomaithe, agus sa chás sin amháin)
<i>Cronobacter</i> spp. (<i>Enterobacter sakazakii</i>)	Neamhláithreach in 10 g (i gcás ina gcuirtear é le bainne foirmle triomaithe do naíonáin agus bianna triomaithe chun críocha speisialta míochaine a cheaptar do naíonáin atá faoi bhun 6 mhí d'aois, agus sa chás sin amháin)

;

- (7) cuirtear an méid seo a leanas in ionad na hiontrála maidir le ‘E 1450 SUCSAINÉIT OCHTAINILE SÓIDIAM STÁIRSE’:

‘E 1450 SUCSAINÉIT OCHTAINILE SÓIDIAM STÁIRSE

Comhchiallaigh	SOSS
Sainmhíniú	Stáirse modhnaithe atá i sucsainéit ochtainile sóidiam stáirse. Monaraítear é trí sciodar stáirse bia a chóireáil le hainhidríd ochtainiolsucsanach. Tar éis an méid iomchuí eistearúcháin a bhaint amach, gnóthaítear an stáirse modhnaithe trína neodró le haigéad, trína níochán le huisce, ní trína dhí-uisciú agus a thriomú.
Einecs	
Ainm ceimiceach	
Foirmle cheimiceach	
Meáchan móilíneach	
Measúnacht	
Tuairisc	Púdar nó gráinníní nó calóga bána nó beagnach bán (nuair atá sí réamhgheilitínithe), púdar éagruthach nó cáithníní garbha
Sainaithint	
Breathnú micreascópach	Pas sa tástáil (nuair nach bhfuil sí réamhgheilitínithe)
Ruaimniú iaidín	Pas sa thástáil (dath idir gorm dorcha agus dearg éadrom)
Íonacht	

Caillteanas mar gheall ar thriomú	Nach mó ná 15,0 % le haghaidh stáirse gránaigh Nach mó ná 21,0 % le haghaidh stáirse prátaí Nach mó ná 18,0 % le haghaidh stáirse eile
Grúpaí ochtainiolsucsainile	Nach mó ná 3 % (ar bhonn ainhidriúil)
Iarmhar aigéid ochtainiolsucsainile	Nach mó ná 0,3 % (ar bhonn ainhidriúil)
Dé-ocsaíd sulfair	Nach mó ná 10 mg/kg ar bhonn ainhidriúil
Arsanaic	Nach mó ná 0,05 mg/kg (ar bhonn ainhidriúil) (i gcás ina gcuirtear é le bia do naíonáin agus do leanaí óga, agus sa chás sin amháin) Nach mó ná 0,1 mg/kg (ar bhonn ainhidriúil) (le haghaidh na n-úsáidí uile cé is moite de bhianna a cheaptar do naíonáin agus do leanaí óga amháin)
Luaidhe	Nach mó ná 0,03 mg/kg (ar bhonn ainhidriúil) (i gcás ina gcuirtear é le bia do naíonáin agus do leanaí óga, agus sa chás sin amháin) Nach mó ná 0,2 mg/kg (ar bhonn ainhidriúil) (le haghaidh na n-úsáidí uile cé is moite de bhianna a cheaptar do naíonáin agus do leanaí óga amháin)
Mearcair	Nach mó ná 0,05 mg/kg (ar bhonn ainhidriúil)
Caidmiam	Nach mó ná 0,01 mg/kg (ar bhonn ainhidriúil) (i gcás ina gcuirtear é le bia do naíonáin agus do leanaí óga, agus sa chás sin amháin) Nach mó ná 0,1 mg/kg (ar bhonn ainhidriúil) (le haghaidh na n-úsáidí uile cé is moite de bhianna a cheaptar do naíonáin agus do leanaí óga amháin)
Glútan	Saor ó ghlútan, i mbainne foirmle do naíonáin agus bainne foirmle leantach amháin, i gcomhréir le Rialachán Tarmligthe (AE) 2016/127/CE ón gCoimisiún an 25 Meán Fómhair 2015
Critéir mhicribhitheolaíocha	
<i>Enterobacteriaceae</i>	Neamhláithreach in 10 g (i gcás ina gcuirtear é le bainne foirmle triomaithe do naíonáin, bianna triomaithe chun críocha speisialta míochaine a cheaptar do naíonáin atá faoi bhun 6 mhí d'aois agus foirmle leantach triomaithe, agus sa chás sin amháin)
<i>Escherichia coli</i>	Neamhláithreach in 10 g (i gcás ina gcuirtear é le bianna do naíonáin iad, agus sa chás sin amháin)
<i>Salmonella</i> spp.	Neamhláithreach in 25 g (i gcás ina gcuirtear é le bainne foirmle triomaithe do naíonáin, bianna triomaithe chun críocha speisialta

		míochaine a cheaptar do naíonáin atá faoi bhun 6 mhí d'aois agus foirmle leantach triomaithe, agus sa chás sin amháin)
<i>Cronobacter</i> (<i>Enterobacter</i> <i>sakazakii</i>)	spp.	Neamhláithreach in 10 g (i gcás ina gcuirtear é le bainne foirmle triomaithe do naíonáin agus bianna triomaithe chun críocha speisialta míochaine a cheaptar do naíonáin atá faoi bhun 6 mhí d'aois, agus sa chás sin amháin)