



Brüssel, 31. märts 2026  
(OR. en)

7825/26  
ADD 1

DELECT 60  
VETER 43  
AGRILEG 71

## SAATEMÄRKUSED

---

Saatja:	Euroopa Komisjoni peasekretär, allkirjastanud Martine DEPREZ, direktor
Kättesaamise kuupäev:	27. märts 2026
Saaja:	Thérèse BLANCHET, Euroopa Liidu Nõukogu peasekretär
Komisjoni dok nr:	C(2026) 900 annex
Teema:	LISA järgmise dokumendi juurde: KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) .../..., millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) 2020/686 lammaste katarralse palaviku viiruse (serotüübid 1–24) nakkuse, epizootilise hemorraagia viiruse nakkuse ja hobuste nakkava metriidi ( <i>Taylorella equigenitalis</i> ) osas

---

Käesolevaga edastatakse delegatsioonidele dokument C(2026) 900 annex.

---

Lisatud: C(2026) 900 annex



Brüssel, 27.3.2026  
C(2026) 900 final

ANNEX

**LISA**

**järgmise dokumendi juurde:**

**KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) .../...,**

**millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) 2020/686 lammaste katarralse palaviku viiruse (serotüübid 1–24) nakkuse, epizootilise hemorraagia viiruse nakkuse ja hobuste nakkava metriidi (*Taylorella equigenitalis*) osas**

## LISA

II lisa muudetakse järgmiselt:

1) 4. osa muudetakse järgmiselt:

a) I peatüki punkti 1 alapunkti a alapunkt iii asendatakse järgmisega:

„iii) hobuste nakkava metriidi (*Taylorella equigenitalis*) tauditekitaja tuvastamise uuring, mille tulemus peab olema kõikidel juhtudel negatiivne ja mis tehakse kolme tampooniprooviga, mis on võetud doonortäkult kahel korral vähemalt seitsmepäevase vahega ning mitte mingil juhul varem kui seitse päeva (süsteemne ravi) või 21 päeva (kohalik ravi) pärast doonortäku võimalikku antimikroobikumiravi vähemalt järgmistest kohtadest:

- kürvatupest (eesnahk),
- kusitist,
- kusitilohust.

Enne laborisse saatmist pannakse külviks ettenähtud proovid aktiivsõega (nt Amies' sõega) transportsöötmesse.

Proovid peavad läbima vähemalt ühe järgmistest uuringutest:

- tauditekitaja *Taylorella equigenitalis*'e isoleerimiseks mikroaerofiilsetes tingimustes tehtud vähemalt seitsmepäevane külv, mis on tehtud 24 tunni jooksul pärast doonorloomalt proovide võtmist või 48 tunni jooksul, kui proove hoitakse veo ajal jahedas, või
- PCR või reaajas jälgitav PCR tauditekitaja *Taylorella equigenitalis*'e genoomi tuvastamiseks, mis on tehtud 7 päeva jooksul pärast doonorloomalt proovide võtmist;“;

b) II peatüki punkti 2 alapunkt c asendatakse järgmisega:

„c) neile on tehtud hobuste nakkava metriidi (*Taylorella equigenitalis*) tauditekitaja tuvastamise uuring, mille tulemus peab olema kõikidel juhtudel negatiivne, kasutades vähemalt kahte tampooniproovi, mis on võetud doonorloomalt kõige varem seitse päeva (süsteemne ravi) või 21 päeva (kohalik ravi) pärast doonorlooma võimalikku antimikroobikumiravi vähemalt järgmistest kohtadest:

- kliitorilohu limaskest,
- kliitorurge.

Proovid võetakse alapunktis a osutatud vähemalt 30päevasel perioodil kahel korral vähemalt seitsmepäevase vahega alapunktis i osutatud uuringu puhul või ühel korral alapunktis ii osutatud uuringu puhul.

Enne laborisse saatmist pannakse alapunktis i osutatud proovid aktiivsõega (nt Amies' sõega) transportsöötmesse.

Proovid peavad läbima vähemalt ühe järgmistest uuringutest:

- i) tauditekitaja *Taylorella equigenitalis*'e isoleerimiseks mikroaerofiilsetes tingimustes tehtud vähemalt seitsmepäevane

külv, mis on tehtud 24 tunni jooksul pärast doonorloomalt proovide võtmist või 48 tunni jooksul, kui proove hoitakse veo ajal jahedas, või

- ii) PCR või reaalaajas jälgitav PCR tauditekitaja *Taylorella equigenitalis*'e genoomi tuvastamiseks, mis on tehtud 7 päeva jooksul pärast doonorloomalt proovide võtmist.“;

2) 5. osa muudetakse järgmiselt:

a) II peatükki muudetakse järgmiselt:

i) punkti 1 alapunkt a asendatakse järgmisega:

„a) neid on peetud vähemalt 60 päeva jooksul enne sperma kogumist ja sperma kogumise ajal liikmesriigis või selle tsoonis, kus 150 km raadiuses asjaomasest ettevõttest ei ole vähemalt kahel eelnenud aastal teadaolevalt esinenud lammaste katarraalse palaviku viiruse (serotüübid 1–24) nakkust;“;

ii) punkti 1 alapunkt b asendatakse järgmisega:

„b) neid on peetud vähemalt 60 päeva jooksul enne sperma kogumist ja sperma kogumise ajal piirkonnas, mis on lammaste katarraalse palaviku viiruse (serotüübid 1–24) suhtes hooajaliselt siirutajavaba;“;

iii) punkti 2 alapunkt a asendatakse järgmisega:

„a) neid on peetud vähemalt 60 päeva jooksul enne ootsüütide või embrüote kogumist ja ootsüütide või embrüote kogumise ajal liikmesriigis või selle tsoonis, kus 150 km raadiuses asjaomasest ettevõttest ei ole vähemalt kahel eelnenud aastal teadaolevalt esinenud lammaste katarraalse palaviku viiruse (serotüübid 1–24) nakkust;“;

iv) punkti 2 alapunkt b asendatakse järgmisega:

„b) neid on peetud vähemalt 60 päeva jooksul enne ootsüütide või embrüote kogumist ja selle ajal piirkonnas, mis on lammaste katarraalse palaviku viiruse (serotüübid 1–24) nakkuse suhtes hooajaliselt siirutajavaba;“;

b) III peatükki muudetakse järgmiselt:

i) pealkiri asendatakse järgmisega:

**„Epizootilise hemorraagia viiruse nakkusega seotud nõuded veistele, lammastele, kitsedele ning *Camelidae* ja *Cervidae* sugukonna loomadele“;**

ii) punkti 1 sissejuhatav lause asendatakse järgmisega:

„Spermadoonoriteks olevad veised, lambad ja kitsed ning *Camelidae* ja *Cervidae* sugukonna loomad peavad vastama vähemalt ühele järgmisele tingimusele:“;

iii) punkti 1 alapunkt b asendatakse järgmisega:

- „b) neid on peetud vähemalt 60 päeva jooksul enne sperma kogumist ja sperma kogumise ajal piirkonnas, mis on epizootilise hemorraagia viiruse nakkuse suhtes hooajaliselt siirutajavaba;“;
- iv) punkti 2 sissejuhatav lause asendatakse järgmisega:  
„Veised, lambad ja kitsed ning *Camelidae* ja *Cervidae* sugukonna loomad, kes on embrüote *in vitro* tootmiseks kasutatavate ootsüütide doonorid ning *in vivo* saadud embrüote doonorid, peavad vastama vähemalt ühele järgmisele tingimusele:“;
- v) punkti 2 alapunkt b asendatakse järgmisega:  
„b) neid on peetud vähemalt 60 päeva jooksul enne ootsüütide või embrüote kogumist ja kogumise ajal piirkonnas, mis on epizootilise hemorraagia viiruse nakkuse suhtes hooajaliselt siirutajavaba;“.