



Съвет на
Европейския съюз

Брюксел, 26 април 2023 г.
(OR. en)

8417/23
ADD 1

SAN 216
PHARM 62
VETER 47
ENV 427
PHYTOSAN 21
RECH 149

ПРИДРУЖИТЕЛНО ПИСМО

От:	Генералния секретар на Европейската комисия, подписано от г-жа Martine DEPREZ, директор
До:	Г-жа Thérèse BLANCHET, генерален секретар на Съвета на Европейския съюз
№ док. Ком.:	COM(2023) 191 final - ANNEX
Относно:	ПРИЛОЖЕНИЕ към Предложение за ПРЕПОРЪКА НА СЪВЕТА за засилване на действията на ЕС за борба с антимикробната резистентност съгласно подхода „Едно здраве“

Приложено се изпраща на делегациите документ COM(2023) 191 final - ANNEX.

Приложение: COM(2023) 191 final - ANNEX



ЕВРОПЕЙСКА
КОМИСИЯ

Брюксел, 26.4.2023 г.
COM(2023) 191 final

ANNEX

ПРИЛОЖЕНИЕ

към

Предложение за ПРЕПОРЪКА НА СЪВЕТА

**за засилване на действията на ЕС за борба с антимикробната резистентност
съгласно подхода „Едно здраве“**

{SWD(2023) 190 final}

ПРИЛОЖЕНИЕ

Принос на държавите членки за постигане на препоръчителните целеви стойности на ЕС, установени в точка Д от настоящата препоръка¹.

1. Национални препоръчителни целеви стойности за общото потребление на антибиотици в обществен и болничния сектор заедно, включително в заведенията за дългосрочни грижи (ДДД на 1000 жители на ден)

Държава членка	Общо потребление на антибиотици в обществен и болничния сектор заедно, включително в заведенията за дългосрочни грижи, (ДДД на 1000 жители на ден) през 2019 г. ²	Препоръчителна целева стойност за намаление
NL	9,5	3 %
AT	11,6	3 %
EE	11,8	3 %
SE	11,8	3 %
DE	12,6 ³	9 %
SI	13,0	9 %
LV	13,9	9 %
HU	14,4	9 %
FI	14,7	9 %
DK	15,3	9 %
LT	16,1	9 %
CZ	16,9	9 %
HR	18,8	9 %

¹ Някои държави членки са постигнали напредък в борбата с АМР или употребата на антимикробни средства от базовата 2019 година насам.

² Данни от европейската мрежа за надзор на потреблението на антимикробни средства (ESAC-Net). Данните за статистическата съвкупност са от Евростат.

³ Германия не е предоставила на ESAC-Net данни за потреблението в болничния сектор. Общото потребление е изчислено въз основа на средния за ЕС дял на потреблението в болничния сектор като част от общото потребление.

PT	19,3	9 %
SK	19,3	9 %
BG	20,7	18 %
MT	20,7	18 %
LU	21,1	18 %
BE	21,4	18 %
IT	21,7	18 %
IE	22,8	27 %
PL	23,6	27 %
ES	24,9	27 %
FR	25,1	27 %
RO	25,8	27 %
CY	30,1	27 %
EL	34,1	27 %

2. Национални препоръчителни целеви стойности за процента на потребление на антибиотици от групата Access от потреблението на всички антибиотици (Access, Watch, Reserve, Unclassified [„достъпни, наблюдавани, резервни, неклассифицирани“]), включени в класификацията AWaRe на СЗО⁴

Държава членка	Процент на потребление на антибиотици от групата Access от потреблението на всички антибиотици (Access, Watch, Reserve, Unclassified), включени в класификацията AWaRe през 2019 г. ⁵	Препоръчителна целева стойност
DK	79,1	Поне 65 %
FI	73,2	
FR	72,0	
NL	71,2	
SE	71,0	
IE	70,3	
LV	68,6	
BE	67,9	
LT	67,5	
ES	63,0	
HR	62,7	
SI	62,1	
PT	61,4	
EE	61,3	
PL	60,4	

⁴

<https://www.who.int/publications/i/item/2021-aware-classification>

⁵

Данни от европейската мрежа за надзор на потреблението на антимикробни средства (ESAC-Net). Данните за статистическата съвкупност са от Евростат.

CZ	60,2	
LU	59,5	
AT	58,1	
RO	52,8	
HU	50,5	
MT	49,9	
IT	48,9	
CY	48,9	
EL	46,8	
BG	45,1	
SK	42,4	
DE	няма данни ⁶	

⁶ Германия не е предоставила на ESAC-Net данни за потреблението в болничния сектор. Следователно този процент не може да бъде изчислен.

3. Национални препоръчителни целеви стойности по отношение на заболяемостта от инфекции на кръвта, причинени от метицилин-резистентни *Staphylococcus aureus* (MRSA), (брой на 100 000 души население)

Държава членка	Заболеваемост от инфекции на кръвта, причинени от метицилин-резистентни <i>Staphylococcus aureus</i> (MRSA), (брой инфекции на кръвта ⁷ на 100 000 души население) през 2019 г.	Препоръчителна целева стойност за намаление
NL	0,4	3%
DK	0,8	3 %
EE	0,8	3 %
FI	1,1	3 %
SE	1,3	3 %
BG	1,5	3 %
LV	1,9	6 %
LU	2,1	6 %
AT	2,2	6 %
LT	2,2	6 %
SI	2,4	6 %
BE	2,6	6 %
HR	2,7	6 %
IE	3,1	6 %
CZ	3,1	6 %

⁷

Въз основа на съществуващите данни относно инвазивните изолати, налични в Европейската система за наблюдение на антимикробната резистентност (EARS-Net), според които инвазивните изолати са предимно (>99 %) от инфекции на кръвта и много малък процент (<1 %) са изолати от менингитиди. Данните за статистическата съвкупност са от Евростат.

DE	3,6	10 %
MT	3,8	10 %
HU	4,2	10 %
ES	4,2	10 %
PL	4,3	10 %
EL	4,6	10 %
SK	5,0	10 %
FR	5,6	18 %
CY	6,9	18 %
PT	11,4	18 %
IT	13,6	18 %
RO	13,7	18 %

4. Национални препоръчителни целеви стойности по отношение на заболяемостта от инфекции на кръвта, причинени от резистентни на трето поколение цефалоспорини *Escherichia coli* (брой на 100 000 души население)

Държави членки	Заболеваемост от инфекции на кръвта ⁸ , причинени от резистентни на трето поколение цефалоспорини <i>Escherichia coli</i> (брой на 100 000 души население) през 2019 г.	Препоръчителна целева стойност за намаление
EL	2,6	0 %
BG	4,3	0 %
NL	4,5	0 %
LV	5,0	0 %
HR	5,3	0 %
LT	5,6	0 %
HU	5,7	0 %
CY	6,2	5 %
RO	6,3	5 %
SK	6,4	5 %
CZ	6,6	5 %
DK	6,6	5 %
AT	7,1	10 %
PL	7,4	10 %
SI	7,7	10 %

⁸ Въз основа на съществуващите данни относно инвазивните изолати, налични в Европейската система за наблюдение на антимикробната резистентност (EARS-Net), според които инвазивните изолати са предимно (>99 %) от инфекции на кръвта и много малък процент (<1 %) са изолати от менингитиди. Данните за статистическата съвкупност са от Евростат.

ES	7,8	10 %
EE	7,9	10 %
FI	8,0	10 %
IE	8,3	10 %
FR	8,6	10 %
SE	9,6	10 %
LU	10,1	12 %
PT	10,3	12 %
DE	12,0	12 %
MT	12,4	12 %
BE	13,2	12 %
IT	23,2	12 %

5. Национални препоръчителни целеви стойности по отношение на заболяемостта от инфекции на кръвта, причинени от карбапенем-резистентни *Klebsiella pneumoniae*, (брой на 100 000 души население)

Държава членка	Заболеваемост от инфекции на кръвта ⁹ , причинени от карбапенем-резистентни <i>Klebsiella pneumoniae</i> , (брой на 100 000 души население) през 2019 г.	Препоръчителна целева стойност за намаление
EE	0,00	0 %
LV	0,00	0 %
NL	0,02	0 %
SE	0,03	0 %
SI	0,05	2 %
FI	0,06	2 %
DK	0,07	2 %
CZ	0,09	2 %
HU	0,09	2 %
IE	0,11	2 %
LU	0,16	2 %
DE	0,20	2 %
AT	0,20	2 %
FR	0,22	2 %
BE	0,27	2 %
SK	0,52	4 %

⁹ Въз основа на съществуващите данни относно инвазивните изолати, налични в Европейската система за наблюдение на антимикробната резистентност (EARS-Net), според които инвазивните изолати са предимно (>99 %) от инфекции на кръвта и много малък процент (<1 %) са изолати от менингитиди. Данните за статистическата съвкупност са от Евростат.

LT	0,54	4 %
ES	0,76	4 %
HR	1,20	4 %
PL	1,38	4 %
MT	2,13	4 %
BG	2,29	4 %
CY	2,61	5 %
PT	2,93	5 %
RO	7,12	5 %
IT	8,51	5 %
EL	13,05	5 %