



Συμβούλιο
της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Βρυξέλλες, 26 Απριλίου 2023
(OR. en)

8417/23
ADD 1

SAN 216
PHARM 62
VETER 47
ENV 427
PHYTOSAN 21
RECH 149

ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Αποστολέας:	Για τη Γενική Γραμματέα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η κα Martine DEPREZ, Διευθύντρια
Αποδέκτης:	κα Thérèse BLANCHET, Γενική Γραμματέας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Αριθ. εγγρ. Επιτρ.:	COM(2023) 191 final - ANNEX
Θέμα:	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της πρότασης για σύσταση του Συμβουλίου σχετικά με την ενίσχυση των δράσεων της ΕΕ για την καταπολέμηση της μικροβιακής αντοχής στο πλαίσιο της προσέγγισης «Μία υγεία»

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2023) 191 final - ANNEX.

σνημμ.: COM(2023) 191 final - ANNEX



ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Βρυξέλλες, 26.4.2023
COM(2023) 191 final

ANNEX

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

της

πρότασης για σύσταση του Συμβουλίου

**σχετικά με την ενίσχυση των δράσεων της ΕΕ για την καταπολέμηση της μικροβιακής
αντοχής στο πλαίσιο της προσέγγισης «Μία υγεία»**

{SWD(2023) 190 final}

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Συνεισφορές των κρατών μελών για την επίτευξη των συνιστώμενων από την ΕΕ στόχων που καθορίζονται στο τμήμα Ε της παρούσας σύστασης¹.

1. Εθνικοί συνιστώμενοι στόχοι για τη συνολική κατανάλωση αντιβιοτικών σε επίπεδο κοινότητας και νοσοκομείων συνδυαστικά, μεταξύ άλλων και στις μονάδες μακροχρόνιας φροντίδας [καθορισμένη ημερήσια δόση (DDD) ανά 1 000 κατοίκους ημερησίως]

Κράτος μέλος	Συνολική κατανάλωση αντιβιοτικών σε επίπεδο κοινότητας και νοσοκομείων συνδυαστικά, μεταξύ άλλων και στις μονάδες μακροχρόνιας φροντίδας (DDD ανά 1 000 κατοίκους ημερησίως) το 2019 ²	Συνιστώμενος στόχος μείωσης
NL	9,5	3 %
AT	11,6	3 %
EST	11,8	3 %
SE	11,8	3 %
DE	12,6 ³	9 %
SI	13,0	9 %
LV	13,9	9 %
HU	14,4	9 %
FI	14,7	9 %
DK	15,3	9 %
LT	16,1	9 %
CZ	16,9	9 %
HR	18,8	9 %

¹ Ορισμένα κράτη μέλη έχουν σημειώσει πρόοδο στην αντιμετώπιση της μικροβιακής αντοχής ή της κατανάλωσης αντιμικροβιακών σε σχέση με το έτος αναφοράς 2019.

² Στοιχεία από το Ευρωπαϊκό δίκτυο επιτήρησης κατανάλωσης αντιβιοτικών (ESAC-Net). Τα στοιχεία για τον πληθυσμό προέρχονται από την Eurostat.

³ Η Γερμανία δεν υπέβαλε στοιχεία στο ESAC-Net σχετικά με την κατανάλωση στον νοσοκομειακό τομέα. Η συνολική κατανάλωση εκτιμήθηκε με βάση το μέσο ποσοστό κατανάλωσης στον νοσοκομειακό τομέα στην ΕΕ ως μέρος της συνολικής κατανάλωσης.

PT	19,3	9 %
SK	19,3	9 %
BG	20,7	18 %
MT	20,7	18 %
LU	21,1	18 %
BE	21,4	18 %
IT	21,7	18 %
IE	22,8	27 %
PL	23,6	27 %
ES	24,9	27 %
FR	25,1	27 %
RO	25,8	27 %
CY	30,1	27 %
EL	34,1	27 %

2. Εθνικοί συνιστώμενοι στόχοι για το ποσοστό κατανάλωσης αντιβιοτικών της ομάδας «Access» (άμεσης πρόσβασης) επί της κατανάλωσης όλων των αντιβιοτικών [κατηγορίες «Access» (άμεσης πρόσβασης), «Watch» (υπό επιτήρηση), «Reserve» (υπό προστασία), «Non-Classification» (μη ταξινομημένα)] που απαριθμούνται στην ταξινόμηση AWaRe του ΠΟΥ^{4]}

Κράτος μέλος	Ποσοστό κατανάλωσης αντιβιοτικών της ομάδας «Access» επί της κατανάλωσης όλων των αντιβιοτικών («Access», «Watch», «Reserve», «Non-Classification») που απαριθμούνται στην ταξινόμηση AWaRe, το 2019 ⁵	Συνιστώμενος στόχος
DK	79,1	τουλάχιστον 65 %
FI	73,2	
FR	72,0	
NL	71,2	
SE	71,0	
IE	70,3	
LV	68,6	
BE	67,9	
LT	67,5	
ES	63,0	
HR	62,7	
SI	62,1	
PT	61,4	
EST	61,3	
PL	60,4	
CZ	60,2	

⁴ <https://www.who.int/publications/i/item/2021-aware-classification>

⁵ Στοιχεία από το Ευρωπαϊκό δίκτυο επιτήρησης κατανάλωσης αντιβιοτικών (ESAC-Net). Τα στοιχεία για τον πληθυσμό προέρχονται από την Eurostat.

LU	59,5	
AT	58,1	
RO	52,8	
HU	50,5	
MT	49,9	
IT	48,9	
CY	48,9	
EL	46,8	
BG	45,1	
SK	42,4	
DE	Δεν υπάρχουν στοιχεία ⁶	

⁶ Η Γερμανία δεν υπέβαλε στοιχεία στο ESAC-Net σχετικά με την κατανάλωση στον νοσοκομειακό τομέα. Ως εκ τούτου, το ποσοστό αυτό δεν μπορεί να υπολογιστεί.

3. Εθνικοί συνιστώμενοι στόχοι για την επίπτωση των βακτηριαιμιών από τον ανθεκτικό στη μεθικιλίνη *Staphylococcus aureus* (MRSA) (αριθμός ανά 100 000 κατοίκους)

Κράτος μέλος	Επίπτωση βακτηριαιμιών από τον ανθεκτικό στη μεθικιλίνη <i>Staphylococcus aureus</i> (MRSA) (αριθμός βακτηριαιμιών ⁷ ανά 100 000 κατοίκους) το 2019	Συνιστώμενος στόχος μείωσης
NL	0,4	3 %
DK	0,8	3 %
EST	0,8	3 %
FI	1,1	3 %
SE	1,3	3 %
BG	1,5	3 %
LV	1,9	6 %
LU	2,1	6 %
AT	2,2	6 %
LT	2,2	6 %
SI	2,4	6 %
BE	2,6	6 %
HR	2,7	6 %
IE	3,1	6 %
CZ	3,1	6 %
DE	3,6	10 %
MT	3,8	10 %
HU	4,2	10 %

⁷ Με βάση τα υφιστάμενα στοιχεία που είναι διαθέσιμα από το Ευρωπαϊκό δίκτυο επιτήρησης της μικροβιακής αντοχής (EARS-Net) όσον αφορά τα απομονωθέντα διεισδυτικά στελέχη, σύμφωνα με τα οποία τα απομονωθέντα διεισδυτικά στελέχη προέρχονται ως επί το πλείστον (> 99 %) από βακτηριαιμίες, με πολύ μικρό ποσοστό (< 1 %) απομονωθέντων στελεχών από μηνιγγίτιδες. Τα στοιχεία για τον πληθυσμό προέρχονται από την Eurostat.

ES	4,2	10 %
PL	4,3	10 %
EL	4,6	10 %
SK	5,0	10 %
FR	5,6	18 %
CY	6,9	18 %
PT	11,4	18 %
IT	13,6	18 %
RO	13,7	18 %

4. Εθνικοί συνιστώμενοι στόχοι για την επίπτωση των βακτηριαιμιών από την ανθεκτική σε κεφαλοσπορίνες τρίτης γενιάς *Escherichia coli* (αριθμός ανά 100 000 κατοίκους)

Κράτη μέλη	Επίπτωση βακτηριαιμιών από την ανθεκτική σε κεφαλοσπορίνες τρίτης γενιάς <i>Escherichia coli</i> ⁸ (αριθμός ανά 100 000 κατοίκους) το 2019	Συνιστώμενος στόχος μείωσης
EL	2,6	0 %
BG	4,3	0 %
NL	4,5	0 %
LV	5,0	0 %
HR	5,3	0 %
LT	5,6	0 %
HU	5,7	0 %
CY	6,2	5 %
RO	6,3	5 %
SK	6,4	5 %
CZ	6,6	5 %
DK	6,6	5 %
AT	7,1	10 %
PL	7,4	10 %
SI	7,7	10 %
ES	7,8	10 %
EST	7,9	10 %

⁸ Με βάση τα υφιστάμενα στοιχεία που είναι διαθέσιμα από το Ευρωπαϊκό δίκτυο επιτήρησης της μικροβιακής αντοχής (EARS-Net) όσον αφορά τα απομονωθέντα διεισδυτικά στελέχη, σύμφωνα με τα οποία τα απομονωθέντα διεισδυτικά στελέχη προέρχονται ως επί το πλείστον (> 99 %) από βακτηριαιμίες, με πολύ μικρό ποσοστό (< 1 %) απομονωθέντων στελεχών από μηνιγγίτιδες. Τα στοιχεία για τον πληθυσμό προέρχονται από την Eurostat.

FI	8,0	10 %
IE	8,3	10 %
FR	8,6	10 %
SE	9,6	10 %
LU	10,1	12 %
PT	10,3	12 %
DE	12,0	12 %
MT	12,4	12 %
BE	13,2	12 %
IT	23,2	12 %

5. Εθνικοί συνιστώμενοι στόχοι για την επίπτωση των βακτηριαμίων από την ανθεκτική στις καρβαπενέμες *Klebsiella pneumoniae* (αριθμός ανά 100 000 κατοίκους)

Κράτος μέλος	Επίπτωση βακτηριαμίων από την ανθεκτική στις καρβαπενέμες <i>Klebsiella pneumoniae</i> ⁹ (αριθμός ανά 100 000 κατοίκους) το 2019	Συνιστώμενος στόχος μείωσης
EST	0,00	0 %
LV	0,00	0 %
NL	0,02	0 %
SE	0,03	0 %
SI	0,05	2 %
FI	0,06	2 %
DK	0,07	2 %
CZ	0,09	2 %
HU	0,09	2 %
IE	0,11	2 %
LU	0,16	2 %
DE	0,20	2 %
AT	0,20	2 %
FR	0,22	2 %
BE	0,27	2 %
SK	0,52	4 %
LT	0,54	4 %
ES	0,76	4 %

⁹ Με βάση τα υφιστάμενα στοιχεία που είναι διαθέσιμα από το Ευρωπαϊκό δίκτυο επιτήρησης της μικροβιακής αντοχής (EARS-Net) όσον αφορά τα απομονωθέντα διεισδυτικά στελέχη, σύμφωνα με τα οποία τα απομονωθέντα διεισδυτικά στελέχη προέρχονται ως επί το πλείστον (> 99 %) από βακτηριαμίες, με πολύ μικρό ποσοστό (< 1 %) απομονωθέντων στελεχών από μηνιγγίτιδες. Τα στοιχεία για τον πληθυσμό προέρχονται από την Eurostat.

HR	1,20	4 %
PL	1,38	4 %
MT	2,13	4 %
BG	2,29	4 %
CY	2,61	5 %
PT	2,93	5 %
RO	7,12	5 %
IT	8,51	5 %
EL	13,05	5 %