



Europeiska
unionens råd

Bryssel den 26 april 2023
(OR. en)

8417/23
ADD 1

SAN 216
PHARM 62
VETER 47
ENV 427
PHYTOSAN 21
RECH 149

FÖLJENOT

från:	Europeiska kommissionens generalsekreterare, undertecknat av Martine DEPREZ, direktör
till:	Thérèse BLANCHET, generalsekreterare för Europeiska unionens råd
Komm. dok. nr:	COM(2023) 191 final
Ärende:	BILAGOR till Förslag till RÅDETS REKOMMENDATION om intensifiering av EU:s åtgärder för att bekämpa antimikrobiell resistens genom en One health-modell

För delegationerna bifogas dokument – COM(2023) 191 final.

Bilaga: COM(2023) 191 final



EUROPEISKA
KOMMISSIONEN

Bryssel den 26.4.2023
COM(2023) 191 final

ANNEX

BILAGOR

till

Förslag till RÅDETS REKOMMENDATION

**om intensifiering av EU:s åtgärder för att bekämpa antimikrobiell resistens genom en
One health-modell**

{SWD(2023) 190 final}

BILAGA

Medlemsstaternas bidrag för att uppnå de EU-rekommenderade delmålen i punkt E i denna rekommendation¹.

1. Nationella rekommenderade delmål för den totala antibiotikaanvändningen inom öppenvården och sjukhusvården sammanlagt, inklusive vid inrättningar för långtidsvård (i DDD per 1 000 invånare per dag)

Medlemsstat	Total antibiotikaanvändning inom öppenvården och sjukhusvården sammanlagt, inklusive vid inrättningar för långtidsvård (i DDD per 1 000 invånare per dag) under 2019 ²	Rekommenderat delmål för minskning
NL	9,5	3 %
AT	11,6	3 %
EE	11,8	3 %
SE	11,8	3 %
DE	12,6 ³	9 %
SI	13,0	9 %
LV	13,9	9 %
HU	14,4	9 %
FI	14,7	9 %
DK	15,3	9 %
LT	16,1	9 %
CZ	16,9	9 %
HR	18,8	9 %

¹ Vissa medlemsstater har gjort framsteg i hanteringen av antimikrobiell resistens eller användning av antimikrobiella medel sedan referensåret 2019.

² Uppgifter från det europeiska nätverket för övervakning av förbrukning av antimikrobiella medel (ESAC-Net). Populationsuppgifterna kommer från Eurostat.

³ Tyskland har inte rapporterat några uppgifter om användningen inom sjukhusvården till ESAC-Net. Den totala användningen uppskattades på grundval av den genomsnittliga andelen som används inom sjukhusvården i EU i förhållande till den totala användningen.

PT	19,3	9 %
SK	19,3	9 %
BG	20,7	18 %
MT	20,7	18 %
LU	21,1	18 %
BE	21,4	18 %
IT	21,7	18 %
IE	22,8	27 %
PL	23,6	27 %
ES	24,9	27 %
FR	25,1	27 %
RO	25,8	27 %
CY	30,1	27 %
EL	34,1	27 %

2. Nationella rekommenderade delmål för andelen användning i antibiotikagruppen ”Access” i förhållande till användningen av alla grupper av antibiotika (”Access, Watch, Reserve, Unclassified”) enligt WHO:s AWaRe-klassificering⁴

Medlemsstat	Andelen användning i antibiotikagruppen ”Access” i förhållande till användningen av alla grupper av antibiotika (”Access, Watch, Reserve, Unclassified”) enligt AWaRe-klassificeringen under 2019 ⁵	Rekommenderat delmål
DK	79,1	Minst 65 %
FI	73,2	
FR	72,0	
NL	71,2	
SE	71,0	
IE	70,3	
LV	68,6	
BE	67,9	
LT	67,5	
ES	63,0	
HR	62,7	
SI	62,1	
PT	61,4	
EE	61,3	
PL	60,4	
CZ	60,2	

⁴ <https://www.who.int/publications/i/item/2021-aware-classification>.

⁵ Uppgifter från det europeiska nätverket för övervakning av förbrukning av antimikrobiella medel (ESAC-Net). Populationsuppgifterna kommer från Eurostat.

LU	59,5	
AT	58,1	
RO	52,8	
HU	50,5	
MT	49,9	
IT	48,9	
CY	48,9	
EL	46,8	
BG	45,1	
SK	42,4	
DE	Inga uppgifter ⁶	

⁶ Tyskland har inte rapporterat några uppgifter om användningen inom sjukhusvården till ESAC-Net. Denna andel kan därför inte beräknas.

3. Nationella rekommenderade delmål för incidensen för infektioner i blodet med meticillinresistent *Staphylococcus aureus* (MRSA) (antal per 100 000 invånare)

Medlemsstat	Incidensen för infektioner i blodet med meticillinresistent <i>Staphylococcus aureus</i> (MRSA) (antal infektioner i blodet ⁷ per 100 000 invånare) under 2019	Rekommenderat delmål för minskning
NL	0,4	3 %
DK	0,8	3 %
EE	0,8	3 %
FI	1,1	3 %
SE	1,3	3 %
BG	1,5	3 %
LV	1,9	6 %
LU	2,1	6 %
AT	2,2	6 %
LT	2,2	6 %
SI	2,4	6 %
BE	2,6	6 %
HR	2,7	6 %
IE	3,1	6 %
CZ	3,1	6 %
DE	3,6	10 %
MT	3,8	10 %

⁷ På grundval av tillgängliga data om invasiva isolat från det europeiska nätverket för övervakning av antimikrobiell resistens (EARS-Net), enligt vilka invasiva isolat till största delen (> 99 %) kommer från infektioner i blodet, med en mycket liten andel (< 1 %) isolat från hjärnhinneinflammation. Populationsuppgifterna kommer från Eurostat.

HU	4,2	10 %
ES	4,2	10 %
PL	4,3	10 %
EL	4,6	10 %
SK	5,0	10 %
FR	5,6	18 %
CY	6,9	18 %
PT	11,4	18 %
IT	13,6	18 %
RO	13,7	18 %

4. Nationella rekommenderade delmål för incidensen för infektioner i blodet med *Escherichia coli* som är resistent mot tredje generationens cefalosporiner (antal per 100 000 invånare)

Medlemsstat	Incidensen för infektioner i blodet med <i>Escherichia coli</i> som är resistent mot tredje generationens cefalosporiner ⁸ (antal per 100 000 invånare) under 2019	Rekommenderat delmål för minskning
EL	2,6	0 %
BG	4,3	0 %
NL	4,5	0 %
LV	5,0	0 %
HR	5,3	0 %
LT	5,6	0 %
HU	5,7	0 %
CY	6,2	5 %
RO	6,3	5 %
SK	6,4	5 %
CZ	6,6	5 %
DK	6,6	5 %
AT	7,1	10 %
PL	7,4	10 %
SI	7,7	10 %
ES	7,8	10 %
EE	7,9	10 %

⁸ På grundval av tillgängliga data om invasiva isolat från det europeiska nätverket för övervakning av antimikrobiell resistens (EARS-Net), enligt vilka invasiva isolat till största delen (> 99 %) kommer från infektioner i blodet, med en mycket liten andel (< 1 %) isolat från hjärnhinneinflammation. Populationsuppgifterna kommer från Eurostat.

FI	8,0	10 %
IE	8,3	10 %
FR	8,6	10 %
SE	9,6	10 %
LU	10,1	12 %
PT	10,3	12 %
DE	12,0	12 %
MT	12,4	12 %
BE	13,2	12 %
IT	23,2	12 %

5. Nationella rekommenderade delmål för incidensen för infektioner i blodet med karbapenemresistent *Klebsiella pneumoniae*⁹ (antal per 100 000 invånare)

Medlemsstat	Incidensen för infektioner i blodet med karbapenemresistent <i>Klebsiella pneumoniae</i> ⁹ (antal per 100 000 invånare) under 2019	Rekommenderat delmål för minskning
EE	0,00	0 %
LV	0,00	0 %
NL	0,02	0 %
SE	0,03	0 %
SI	0,05	2 %
FI	0,06	2 %
DK	0,07	2 %
CZ	0,09	2 %
HU	0,09	2 %
IE	0,11	2 %
LU	0,16	2 %
DE	0,20	2 %
AT	0,20	2 %
FR	0,22	2 %
BE	0,27	2 %
SK	0,52	4 %
LT	0,54	4 %
ES	0,76	4 %

⁹ På grundval av tillgängliga data om invasiva isolat från det europeiska nätverket för övervakning av antimikrobiell resistens (EARS-Net), enligt vilka invasiva isolat till största delen (> 99 %) kommer från infektioner i blodet, med en mycket liten andel (< 1 %) isolat från hjärnhinneinflammation. Populationsuppgifterna kommer från Eurostat.

HR	1,20	4 %
PL	1,38	4 %
MT	2,13	4 %
BG	2,29	4 %
CY	2,61	5 %
PT	2,93	5 %
RO	7,12	5 %
IT	8,51	5 %
EL	13,05	5 %